

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

Utgiven i Helsingfors den 22 december 2021

1198/2021

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 1 § och bilaga 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall- och foderväxter

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets beslut
ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av vall-
och foderväxter (395/2020) 1 § och **tabeller 2 och 4 i bilaga 3** som följer:



1 §

Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på produktion, certifiering, marknadsföring och import av
utsäde av följande vall- och foderväxtarter:

Gräsväxter (*Poaceae* (*Gramineae*)):

Brunven	<i>Agrostis canina</i> L.
Storven	<i>Agrostis gigantea</i> Roth
Krypven	<i>Agrostis stolonifera</i> L.
Rödven	<i>Agrostis capillaris</i> L.
Ängskavle	<i>Alopecurus pratensis</i> L.
Knylhavre	<i>Arrhenatherum elatius</i> (L.) P. Beauv. ex J. Presl & C. Presl
Plattlosta	<i>Bromus catharticus</i> Vahl
Alaskagräs	<i>Bromus sitchensis</i> Trin.
Bermudagräs*	<i>Cynodon dactylon</i> (L.) Pers.
Hundäxing	<i>Dactylis glomerata</i> L.
Rörsvingel	<i>Festuca arundinacea</i> Schreber
Finsvingel	<i>Festuca filiformis</i> Pourr
Fårsvingel	<i>Festuca ovina</i> L.
Ängssvingel	<i>Festuca pratensis</i> Hudson
Rödsvingel	<i>Festuca rubra</i> L.
Hårdsvingel	<i>Festuca trachyphylla</i> (Hack.) Hack.
Italienskt rajgräs	<i>Lolium multiflorum</i> Lam. (sis. westerwoldiskt rajgräs)
Engelskt rajgräs	<i>Lolium perenne</i> L.
Hybridrajgräs	<i>Lolium x hybridum</i> Hausskn
Phalaris aquatica*	<i>Phalaris aquatica</i> L.
Vildtimotej	<i>Phleum nodosum</i> L.

Kommissionens genomförandedirektiv 2021/415/EU (32021L0415); EUT nr L 81, 9.3.2021, s. 65

Timotej	<i>Phleum pratense</i> L.
Vitgröe*	<i>Poa annua</i> L.
Lundgröe	<i>Poa nemoralis</i> L.
Sengröe	<i>Poa palustris</i> L.
Kärrgröe	<i>Poa trivialis</i> L.
Ängsgröe	<i>Poa pratensis</i> L.
Fjällgröe*	<i>Poa alpina</i> L.
Parkgröe*	<i>Poa chaixii</i> Vill.
Nordgröe*	<i>Poa alpigena</i> Fries.
Gullhavre	<i>Trisetum flavescens</i> (L.) P. Beauv.

Hybrider som har
uppkommit genom korsning
av en art av släktet *Festuca*
med en art av släktet *Lolium*

xFestulolium Asch. & Graebn.

Baljväxter (*Fabaceae*(*Leguminosae*)):

*	<i>Biserrula pelecinus</i> L.
Fodergetruta	<i>Galega orientalis</i> Lam.
Tuppklöver*	<i>Hedysarum coronarium</i> L.
Rödviol*	<i>Lathyrus cicera</i> L.
Käringtand	<i>Lotus corniculatus</i> L.
Vitlupin	<i>Lupinus albus</i> L.
Blålupin	<i>Lupinus angustifolius</i> L.
Gullupin	<i>Lupinus luteus</i> L.
Pigglusern*	<i>Medicago doliata</i> Carmign.
Skivlusern *	<i>Medicago italica</i> (Mill.) Fiori
Mattlusern*	<i>Medicago littoralis</i> Rohde ex Loisel.
Humlelusern	<i>Medicago lupulina</i> L.
Klotlusern*	<i>Medicago murex</i> Willd.
Tagglusern*	<i>Medicago polymorpha</i> L.
Rynklusern*	<i>Medicago rugosa</i> Desr.
Blålusern	<i>Medicago sativa</i> L.
Snäcklusern*	<i>Medicago scutellata</i> (L.) Mill
Tornlusern*	<i>Medicago trunculata</i> Gaertn.
Mellanlusern	<i>Medicago x varia</i> T. Martyn Sand
Esparsett*	<i>Onobrychis viciifolia</i> Scop.
Gulserradella*	<i>Ornithopus compressus</i> L.
Serradella*	<i>Ornithopus sativus</i> Brot.
Åkerärt	<i>Pisum sativum</i> L. (partim)
Alexandrinklöver	<i>Trifolium alexandrium</i> L.
Smultronklöver*	<i>Trifolium fragiferum</i> L.

Gandelklöver*	<i>Trifolium glanduliferum</i> Boiss.
Rosenklöver*	<i>Trifolium hirtum</i> All.
Alsikeklöver	<i>Trifolium hybridum</i> L.
Blodklöver	<i>Trifolium incarnatum</i> L.
Saltklöver*	<i>Trifolium istmocarpon</i> Brot.
Sumpklöver*	<i>Trifolium michelianum</i> Savi
Rödklöver	<i>Trifolium pratense</i> L.
Vitklöver	<i>Trifolium repens</i> L.
Dofklöver	<i>Trifolium resupinatum</i> L.
Spärrklöver*	<i>Trifolium squarrosum</i> L.
Grävkloöver*	<i>Trifolium subterraneum</i> L.
Pilbladsklöver*	<i>Trifolium vesiculosum</i> Savi
Bockhornsklöver*	<i>Trigonella foenum-graecum</i> L.
Purpurvicker*	<i>Vicia benghalensis</i> L.
Bondböna	<i>Vicia faba</i> L.
Ungersk vicker*	<i>Vicia pannonica</i> Crantz.
Fodervicker	<i>Vicia sativa</i> L.
Luddvicker	<i>Vicia villosa</i> Roth

Övriga arter:

Kålrot	<i>Brassica napus</i> L. var. <i>napobrassica</i> (L.) Rchb.
Foderkål, fodermärgkål	<i>Brassica oleracea</i> L. convar. <i>acephala</i> (DC) Alef. var. <i>medullosa</i> Thell. var. <i>varidis</i> L.
Honungsfacelia	<i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.
Svartkämpar*	<i>Plantago lanceolata</i> L.
Oljerättika	<i>Raphanus sativus</i> L. var. <i>oleiformis</i> Pers.
Rörflen*	<i>Phalaris arundinacea</i> L.
Foderlosta*	<i>Bromus inermis</i> L.
Vit sötväppling*	<i>Melilotus alba</i> Medicus
Bovete*	<i>Fagopyrum esculentum</i> Moench.

Denna definition gäller även hybrider som har uppkommit genom korsning av ovan nämnda gräsväxtarter.

Denna förordning tillämpas inte på export av utsäde av de vall- och foderväxtarter som nämns i 1 mom., med undantag för 3, 5 och 6 § i denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2022.

Helsingfors den 16 december 2021

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä

Specialsakkunnig Kati Lassi

KVALITETSKRAV FÖR UTSÄDE

CERTIFIKATUTSÄDE

2 Grobarheten, renheten och antalet av andra arter

Utsädet ska vara förenligt med följande krav och andra villkor i tabell 2 i fråga om grobarheten, renheten och antalet frön av andra arter:

Tabell 2.

Art	Grobarhet (% av de rena fröna)	Härda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)					Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4)				
				Totalt	Enskild art	<i>Elymus repens</i>	<i>Al- opecu- rus myosu- roides</i>	<i>Meli- lotus spp.</i>	<i>Raphanus raphanist- rum</i>	<i>Sinapis arvensis</i>	<i>Avena fatua, Avena sterilis</i>	<i>Cuscuta spp.</i>	<i>Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex na- ritimus</i>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Gräsväxter:													
Rödven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Brunven	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Storven	80 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Kryppen	75 (a)		90	2.0	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ångskavle	70 (a)		75	2.5	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Knylhavre	75 (a)		90	3.0	1.0 (f)	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Plattfösta	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Alaskagräs	75 (a)		97	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	10 (n)
Bermudagräs	70 (a)		90	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	2
Hundäxing	80 (a)		90	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rörsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Finsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Färsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Ångsvingel	80 (a)		95	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
x Festulolum	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Rödsvingel	75 (a)		90	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Härdsvingel	75 (a)		85	2.0	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Italiensk rajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Engelsk rajgräs	80 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Hybridrajgräs	75 (a)		96	1.5	1.0	0.5	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
<i>Phalaris aquatica</i>	75 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5
Vildtimotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Timotej	80 (a)		96	1.5	1.0	0.3	0.3				0	0 (k)	5
Vitgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Lundgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Sengröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Ånggröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Karrgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)
Parkgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Nordgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Fjällgröe	75 (a)		85	2.0 (c)	1.0 (c)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	5 (n)
Gullhavre	70 (a)		75	3.0	1.0 (f)	0.3	0.3				0	0 (j) (k)	2 (n)

Art	Grobarhet		Härda frön högst (% av de rena fröna)	Renhet (% av vikten)	Frön av andra arter högst (% av vikten)						Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4) Grobarhet minst (% av de rena fröna)			
	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Totalt			Enskild art	Elymus repens	Al- opecu- rus myosu- roides	Meli- lotus spp.	Raphanist- rum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex ma- ritimus	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Balväxter: Sågväppling Fodergetruta Tupplöver Rödval Käringtand Vitlupin (*) Blålupin (*) Gullupin (*) Piggulusem Skivulusem Marulusem Humletulusem Klotulusem Tagglusem Blålusem Rynklusem Snäckulusem Tornulusem Mellanulusem Esparsēt Gulseradella Serradella Ärt Alexandrinklöver Smulttronklöver Glandeklöver Rosenklöver Alsikeklöver Blocklöver Salklöver Sumpklöver Rödklöver Vitklöver Luktklöver	70			0.5										
	60	(a) (b)	40	98	2.0	1.5		0.3			0	0 (j) (k)	10	
	75	(a) (b)	30	97	2.5			0.3			0	0 (l) (m)	10 (n)	
	80			95	1	0.5		0.3			0	0 (k)	5	
	75	(a) (b)	40	95	1.8 (d)	1.0 (d)		0.3			0	0 (j) (k)	20	
	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	75	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)		0.3			0	0 (j)	5 (n)	
	80	(a) (b)	20	98	0.5 (e)	0.3 (e)		0.3			0	0 (j)	5 (m)	
	70			98	2			0.3			0	0 (j)	10	
	70	(a) (b)	20	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	70	(a) (b)	20	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	70	(b)	30	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	70	(b)	30	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	70	(b)	20	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	70	(b)	20	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	70	(b)	20	98	2						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	40	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	75	(a) (b)	20	95	2.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	75			90	1						0	0 (j)	5	
	75			90	1						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a)		98	0.5	0.3		0.3			0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	5 (m)	
	70	(b)	30	98	1						0	0 (j) (k)	10	
	70	(b)	30	98	1						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	75	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
	70	(b)	30	98	1						0	0 (j) (k)	10	
	80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10	
75	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10		
75	(b)	30	98	1						0	0 (j) (k)	10		
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10		
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10		
80	(a) (b)	20	97	1.5	1.0		0.3			0	0 (l) (m)	10		

Art	Grobarhet		Renhet	Frön av andra arter högst (% av vikten)							Maximalt antal frön av andra arter i ett prov med en vikt som fastställs i bilaga 4 (kolumn 4)			
	Grobarhet minst (% av de rena fröna)	Grobarhet minst (% av de rena fröna)		Renhet (% av vikten)	Totalt	En-sikld art	Elymus repens	Allopecurus myosuroides	Melilotus spp.	Raphanus raphanistrum	Sinapis arvensis	Avena fatua, Avena sterilis	Cuscuta spp.	Rumex spp. utöver Rumex acetosella och Rumex maritimus
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Spärrklöver	75 (b)	20	97	1.5				0.3				0	0 (l) (m)	10
	80 (b)	40	97	0.5							0	0 (l) (k)	10	
	Pilbladsklöver	70	98	1							0	0 (l) (k)	10	
	Bockhornsklöver	80 (a)	95	1.0	0.5			0.3			0	0 (l)	5	
	Purpurvicker	80 (b)	20	97 (e)	1						0	0 (l) (k)	10	
	Bondböna	80 (a) (b)	5	98	0.5	0.3		0.3			0	0 (l)	5 (n)	
	Ungersk vicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)		0.3			0	0 (l)	5 (n)	
	Fodervicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)		0.3			0	0 (l)	5 (n)	
	Luddvicker	85 (a) (b)	20	98	1.0 (e)	0.5 (e)		0.3			0	0 (l)	5 (n)	
	Övriga arter:													
Kålrot	80 (a)		98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)	5	
	Foderkål, fodermärkal	75 (a)	98	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)	10	
	Honungsfacelia	80 (a)	96	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l) (k)		
	Svartkämpar	75	85	1.5							0	0 (l) (k)	10	
	Öljärättika	80 (a)	97	1.0	0.5				0.3	0.3	0	0 (l)	5	
	Foderfösta	75 (a)	97	1.5	1.0	0.5		0.3			0	0 (l) (k)	10 (n)	
	Rörflen	75 (a)	96	1.5	1.0	0.3		0.3			0	0 (l) (k)	5	
	Vit sövåppling	60 (a)	97	1.5	1.0	0.5		0.3			0	0 (l) (k)		
	Bovete	80 (a)	97	1.5	1.0	0.5					0	0 (l) (k)		

*) I lupinfrön får antalet frön av avvikande färg inte överstiga

- i bitter lupin 2 %
- i andra lupiner 1 %

Högsta tillåtna antalet frön av bitter lupin i andra sorter än bitter lupin är 2,5 %.

- a) Alla färska och friska frön som inte gror efter förbehandling anses vara groende frön.
 - b) I fråga om arter för vilka antalet hårda frön har definierats medräknas de i grobarheten upp till det angivna högsta tillåtna fröantalet.
 - c) Frön av andra *Poa*-arter anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 0,8 % av utsädetets vikt.
 - d) Frön av *Trifolium pratense* anses inte utgöra en orenhet när de utgör högst 1,0 % av utsädetets vikt.
 - e) Frön av *Lupinus albus*, *Lupinus angustifolius*, *Lupinus luteus*, *Pisum sativum*, *Vicia faba* spp, *Vicia pannonica*, *Vicia sativa* och *Vicia villosa* anses inte utgöra orenheter när de utgör högst 0,5 % av utsädetets vikt i andra motsvarande arter.
 - f) Det högsta tillåtna procenttalet frön av en enskild art tillämpas inte på frön av *Poa* spp.
 - g) Antalet frön av *Avena fatua* och *Avena sterilis* behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 12 inte uppfylls.
 - h) Antalet frön av *Cuscuta* spp. behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 13 inte uppfylls.
 - i) Ett frö av *Cuscuta* spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av *Cuscuta* spp. inte ingår i ett annat prov med samma vikt.
 - j) Prov som tas för bestämning av antalet frön av *Cuscuta* spp. ska vara av dubbel vikt jämfört med den provvikt som anges i bilaga 4 punkt 4.
 - k) Ett frö av *Cuscuta* spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet när frön av *Cuscuta* spp. inte ingår i ett annat prov med den dubbla vikten.
 - l) Antalet frön av *Rumex* spp. utöver *Rumex acetosella* och *Rumex maritimus* behöver inte bestämmas, om det inte misstänks att villkoren i kolumn 14 inte uppfylls.
-

BASUTSÄDE

De villkor som i denna bilaga fastställs för certifikatutsäde tillämpas på basutsäde med beaktande av följande bestämmelser:

1. Äkthet

Utsädet ska uppfylla följande krav och övriga villkor som anges i tabell 4:

Tabell 4.

Art	Högsta innehåll av frön av andra arter						
	Sammanlagt (% av vikten)	Antal i ett prov med fastställd vikt (bilaga 4 kolumn 4)					
		Enskild art	<i>Rumex</i> spp. ut- över <i>R. aceto-</i> <i>sella</i> och <i>R.</i> <i>maritimus</i>	<i>Elymus</i> <i>repens</i>	<i>Alope-</i> <i>curus</i> <i>myosu-</i> <i>roides</i>	<i>Melilotus</i> <i>spp.</i>	Övriga vil- kor eller krav
1	2	3	4	5	6	7	8
Gräsväxter:							
Brunven	0.3	20	1	1	1		(j)
Storven	0.3	20	1	1	1		(j)
Rödven	0.3	20	1	1	1		(j)
Krypven	0.3	20	1	1	1		(j)
Ångskavle	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Knylhavre	0.3	20 (a)	2	5	5		(i) (j)
Plattlosta	0.4	20	5	5	5		(j)
Alaskagräs	0.4	20	5	5	5		(j)
Bermudagräs	0.3	20 (a)	1	1	1		(j)
Hundäxing	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Rörsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Finsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Fårsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Ångsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Rödsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Hårdsvingel	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
x Festulolium	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Italienskt rajgräs	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Engelskt rajgräs	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
Hybridrajgräs	0.3	20 (a)	2	5	5		(j)
<i>Phalaris aquatica</i>	0.3	20	2	5	5		(j)
Vildtimotej	0.3	20	2	1	1		(j)
Timotej	0.3	20	2	1	1		(j)
Vitgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Lundgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Sengröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Ångsgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Kärrgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(f) (j)
Fjällgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Parkgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Nordgröe	0.3	20 (b)	1	1	1		(j)
Gullhavre	0.3	20 (c)	1	1	1		(i) (j)
Baljväxter:							
Sågväppling	0.3	20	5				
Fodergetruta	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Tuppklöver	0.3	20	2			0 (e)	(j)
Rödval	0.3	20	5			0 (d)	
Käringtand	0.3	20	3			0 (e)	(g) (j)
Vitlupin	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Blålupin	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)
Gullupin	0.3	20	2			0 (d)	(h) (k)

Art	Högsta innehåll av frön av andra arter						
	Sammanlagt (% av vik- ten)	Antal i ett prov med fastställd vikt (bilaga 4 kolumn 4)					
		Ensikld art	<i>Rumex</i> spp. utö- ver <i>R. aceto- sella</i> och <i>R. ma- ritimus</i>	<i>Elymus repens</i>	<i>Alope- curus myosu- roides</i>	<i>Melilotus spp.</i>	Övriga vil- kor eller krav
1	2	3	4	5	6	7	8
Piggglusern	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Skvilusern	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Mattlusern	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Humlelusern	0.3	20	5	-	-	0 (e)	(j)
Kotlusern	0.3	20	5	-	-	0 (e)	
Tagglusern	0.3	20	5	-	-	-	
Rynklusern	0.3	20	5	-	-	-	
Blålusern	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Snäcklusern	0.3	20	5				
Tornlusern	0.3	20	5				
Mellanlusern	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Esparsett	0.3	20	2			0 (d)	
Gulserradella	0.3	20	5				
Serradella	0.3	20	5				
Åkerärt	0.3	20	2			0 (d)	
Alexandrinerklöver	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Smultronklöver	0.3	20	5				
Glandelklöver	0.3	20	5				
Rosenklöver	0.3	20	5				
Alsikeklöver	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Blodklöver	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Saltklöver	0.3	20	5	-	-	-	(j)
Sumpklöver	0.3	20	5	-	-	-	-
Rödklöver	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Vitklöver	0.3	20	5			0 (e)	(j)
Luktklöver	0.3	20	3			0 (e)	(j)
Spärrklöver	0.3	20	5	-	-	-	-
Grävlöver	0.3	20	5	-	-	-	(j)
Pilbladsklöver	0.3	20	5	-	-	-	(j)
Bockhornsklöver	0.3	20	2			0 (d)	
Purpurvicker	0.3	20	5	-	-	0 (d)	-
Bondböna	0.3	20	2			0 (d)	
Ungersk vicker	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Fodervicker	0.3	20	2			0 (d)	(h)
Luddvicker	0.3	20	2			0 (d)	(h)
<u>Övriga arter:</u>							
Kålrot	0.3	20	2				(j)
Foderkål, fodermärg- kål	0.3	20	3				(j)
Honungsfacelia	0.3	20					
Svartkämpar	0.3	20	3				
Oljerättika	0.3	20	2				
Foderlösa	0.4	20	5	5	5		(j)
Rörflen	0.3	20	2	5	5		(j)
Vit sötväppling	0.3	20	5			0 (e)	(j)

- a) Högsta tillåtna antalet frön av *Poa* spp. är 80.
 - b) Villkoret i kolumn 3 tillämpas inte på frön av *Poa* spp. Högsta tillåtna antal frön av andra arter av *Poa* spp. än den som ska undersökas är 1 frö/prov om 500 frön.
 - c) Högsta tillåtna antal frön av *Poa*spp. är 20.
 - d) Antalet frön av *Melilotus* spp. behöver inte bestämmas om det inte misstänks att villkoren i kolumn 7 inte uppfylls.
 - e) Ett frö av *Melilotus* spp. i ett prov med fastställd vikt anses inte utgöra en orenhet, när inget frö av *Melilotus* spp. förekommer i ett prov med dubbla fastställda vikten.
 - f) Villkor c i tabell 2 tillämpas inte.
 - g) Villkor d i tabell 2 tillämpas inte.
 - h) Villkor e i tabell 2 tillämpas inte.
 - i) Villkor f i tabell 2 tillämpas inte.
 - j) Villkoren k och m i tabell 2 tillämpas inte.
 - k) Högsta tillåtna antal frön av bitter lupin är 1 % i andra sorter än bitter lupin.
-